



Официальный дистрибьютор

ООО «АгроСелект»
394088, г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 29
ИНН 3664053277 КПП 366201001, р/с 40702810913390116437
в Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк г. Воронежа
к/с 30101810600000000681 БИК 042007681
Телефон: 8 (473) 233-81-81, 233-82-82
Электронная почта: agroselect@yandex.ru Сайт: www.agroselect.ru

Исх.№ 14 от 24 05 2026 г

Руководителям
и специалистам предприятия

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Важные элементы технологии Экспресс

- Технология экспресс применяется только на устойчивых гибридах подсолнечника к данной технологии.
- Нельзя вносить препараты на основе трибенурон-метил 750 г/кг если подсолнечник находится в стрессовом состоянии, например, от избыточного увлажнения почвы, от засухи, а также если температура окружающей среды больше 27°C и ниже 10°C, или когда наблюдаются резкие колебания температуры в течении суток, от повреждения градом, вредителями, заморозками, от недостатка питания или другими факторами.
- Также очень важно отметить что нельзя проводить обработки после сильных дождей, на протяжении минимум трех дней. Однако все зависит от почвы, поэтому важно дождаться, чтобы избыточная влага ушла из почвы. Схема внесения гербицидов на подсолнечнике, который устойчив к трибенурон-метил 750 г/кг

Культура	Схема внесения препарата	Объект, против которого проводятся обработки
Подсолнечник	Внесение в два этапа с нормой (г/га) 30+20+ПАВ, 25+25+ПАВ	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки
	Внесение однократно (г/га) с нормой до 50 + ПАВ	

После внесения гербицида растения подсолнечника могут менять окраску (пожелтение), также временно задерживаться в росте, это нормальное явление после обработки. Рост и внешний вид растений восстанавливается на протяжении 1-2 недели.

При повышении нормы внесения препарата на основе трибенурон-метил возможны деформации листьев, или отсутствие основной корзинки, вместо чего на растении образуются дополнительные малопродуктивные корзинки в пазухах листьев.

Оптимальная фаза развития культурных растений для применения технологии экспресс

Гербицид можно вносить по нескольким схемам: однократно и в два этапа.

Однократно препарат вносится в фазу 2-8 настоящих листьев у подсолнечника, при этом норма внесения препарата составляет 40 г/га. Не более 50 г/га в год.

При внесении в два этапа:

- первое внесение гербицида проводят в фазу от 2 до 4 настоящих листьев у подсолнечника, с нормой использования 30 г/га;
- второе внесение проводят в фазу от 4 до 8 настоящих листьев у подсолнечника с нормой использования 20 г/га.

Фаза развития сорняков для применения технологии Экспресс

Чтобы получить максимальную эффективность от внесения гербицида на основе трибенурон-метил на подсолнечнике, важно знать, что эффективность зависит также от фазы развития сорняков на момент обработки.

Рекомендации внесения гербицида по фазам развития сорняков:

- марь белая – максимально до 4 настоящих листьев;
- амброзия полыннолистная – максимально до 2 настоящих листьев;
- подмаренник цепкий – до фазы 3-4 кольца;
- другие однолетние двудольные – до 4-6 настоящих листьев;
- многолетние двудольные (осот) – фаза розетки – начало роста стебля.

Меры безопасности в использовании технологии экспресс

Гибриды подсолнечника устойчивы к трибенуро-метилу, что объясняется специфической генетикой. Есть много факторов, которые могут повлиять на эффективность действия препарата и таким образом привести к угнетению подсолнечника, либо, наоборот, свести действие препарата на сорные растения к минимуму.

- нельзя выращивать подсолнечник на полях, на которых по предшественнику применялись гербициды ингибиторы, например, производные имидазолинов, сульфонилмочевин, триазолпиримидины. Не соблюдение этого регламента может привести к негативному влиянию на устойчивость подсолнечника к гербицидам на основе трибенурон-метила;
- если на поле проводились обработки гербицидами сплошного действия, например на основе глифосата, посев подсолнечника можно проводить не ранее чем через 2 недели после внесения препарата. Разложение препаратов на основе глифосата зависит от активности почвенной микрофлоры;
- нельзя вносить препарат на протяжении 3-х суток после выпадения обильных дождей или орошения, так как это создает избыточное увлажнение почвы, что негативно влияет на эффективность препарата;
- нельзя вносить препарат при засушливых погодных условиях;
- нельзя вносить гербицид при температуре окружающей среды больше +25°C и менее +12°C, так как эффективность препарата существенно снижается. Также нельзя вносить гербициды на основе трибенурон-метила если наблюдаются резкие колебания дневных и ночных температур на период внесения препарата;

- Нельзя вносить другие гербициды в составе баковой смеси с гербицидом Экспресс®. В случае необходимости внесения противозлаковых гербицидов, важно соблюдать интервал между внесением этих препаратов и гербицидом на основе трибенурон-метил – не менее 7 дней;
- нельзя применять инсектициды группы ФОС – фосфорорганические соединения, так как инсектициды данной группы негативно влияют на гербицидное действие препаратов на основе трибенурон-метил;
- Строго запрещается проводить удобрение вегетирующих растений подсолнечника, методом опрыскивания в баковых смесях с внесением препарата Экспресс®, так как это ускорит поступление гербицида в растения подсолнечника, в результате чего возможна токсикация и полная гибель растений.

Борьба с падалицей подсолнечника, которая устойчивая к гербициду, на основе трибенурон-метила

Падалица подсолнечника, который предназначен для технологии экспресс, является устойчивой к гербицидам ингибиторам, например, это производные имидазолинов, сульфонилмочевин, триазолпиримидинов.

Чтобы уничтожить падалицу такого подсолнечника, следует, на последующей культуре, применять препараты, которые имеют другой механизм действия, например препараты на основе флуроксипира, 2,4-Д, МЦПА, клопиралида.

Рекомендации:

В связи с участвовавшим применением аналогов (джинериков) оригинальных препаратов на основе трибенурон-метила, а также с завышением норм применения в 2025 году наблюдалось угнетение растений на гибриде подсолнечника **ЗИМБРУ**.

Рекомендации оригинатора по обработке гербицидом на основе трибенурон-метила гибрида подсолнечника ЗИМБРУ.

- Первое применение не более 30 г/га + ПАВ

- Второе применение 20 г/га + ПАВ

Категорически запрещено совместное применение с граминицидами

Противозлаковые гербициды (граминициды) применяются через 7 дней после первого применения гербицида на основе трибенурон-метила

Директор ООО АгроСелект

Питигин В.С.

